

## المحاضرة العاشرة:

**3 - اضطرابات العرة (Tic Disorder)** العرات هي حركات أو أصوات متكررة (تكون ما بين الإرادي واللاإرادي) = يعني أن الشخص يشعر بها وهي تفرض نفسها عليه، أي تسيطر عليه ولا يمكن إيقافها بشكل كامل ودائم وإلى الأبد (ربما بإمكان الشخص تأخيرها نوعاً ما في بعض الحالات لكن لا يمكن منعها). وتتمثل اضطرابات العرة فيما يلي:

### 1- اضطراب توريت (F95.2) Tourette's Disorder

#### معايير التشخيص:

- A- وجود عرات حركية متعددة (اثنان مختلفان على الأقل فما فوق) مع واحدة أو أكثر من العرات الصوتية في وقت من أوقات المرض، رغم عدم ضرورة وجودهما بصورة متزامنة (يعني عدم ظهورهما في نفس الفترة الزمنية)
- B- تتفاوت العرات في التواتر، فقد تزيد أو تنقص ولكنها تستمر لفترة تزيد عن السنة
- C- البداية قبل سن 18 سنة
- D- لا ينجم الاضطراب عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة (مثل الكوكايين)، أو عن حالة طبية عامة (مثل داء هنتغتون أو التهاب الدماغ الفيروسي).

### 2- اضطراب العرة الحركية أو الصوتية المستمر (المزمن) (Persistent (Chronic) Motor or

#### Vocal Tic Disorder(F95.1)

- A- عرات حركية أو صوتية عديدة أو مفردة، موجودة لبعض الوقت أثناء المرض ولكن لا تحدث كليهما في نفس الوقت.
- B- تتفاوت العرات في التواتر، فقد تزيد أو تنقص ولكنها تستمر لفترة تزيد عن السنة.
- C- البداية قبل سن 18 سنة.
- D- لا ينجم الاضطراب عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة (مثل الكوكايين) أو عن حالة طبية عامة (مثل داء هنتغتون أو بعد التهاب الدماغ الفيروسي).
- E- المعايير لم تحقق أبداً اضطراب توريت.

حدد فيما إذا:

- مع العرات الحركية فقط
- مع العرات الصوتية فقط

### 3- اضطراب العرات التمهيدي (المؤقت) Provisional Tic Disorder(F95.0)

- A- وجود عرة واحدة أو أكثر "متعددة" (يمكن أن تكون حركية / أو صوتية / أو الاثنين معا)
- B- ظهور العرات لفترة أقل من سنة منذ بدء العرة الأولى
- C- البداية قبل سن 18 سنة
- D- لا ينجم الاضطراب بسبب طبي آخر (مثل تأثيرات الأدوية أو المواد أو حالات عصبية)
- E- عدم استيفاء معايير اضطراب توريت أو اضطراب العرة المزمن.